

# Tip van de Maand – April 2019

## Overdracht bacteriën door vliegen.

De meeste verwekkers van uierontsteking zijn onder te verdelen in koe gebonden bacteriën en omgevingsgebonden bacteriën.

Omgevingsgebonden bacteriën, zoals de meest voorkomende Streptokokken Uberis, verspreiden zich vaak via niet schone ligplekken. Of oud vuile plekken, bijvoorbeeld in de buurt van of onder drinkbakken, koeborstels, hekken. Dit vuil wordt ook weer de ligboxen ingelopen en daar gaat een koe weer in liggen...

Of niet schoon melkgerei.

Koegebonden bacteriën zoals Stafylokokken Aureus en Streptokokken Agalactie verspreiden zich van koe tot koe of van melk tot koe. Dus melklekkers, vochtige ligboxen, en ook weer niet schoon melkgerei, zowel aan de buitenkant als binnenkant niet goed gereinigd, kunnen hier voor verspreiding zorgen.

**Maar deze koegebonden bacteriën kunnen ook door vliegen doorgegeven worden!**

En die zitten altijd in elk plasje melk...

Pak de vliegenbestrijding in de stal tijdig aan, dat is ook erg belangrijk voor uiergezondheid!

*En bent u al weer aan het weiden of gaat u weiden?*

*Lees nog even de tips hierover:*

<http://www.harrytuinier.nl/2018/08/01/tip-van-de-maand-augustus-2018/>

<http://www.harrytuinier.nl/2017/05/01/tip-van-de-maand-mei-2017/>

