

# Tip van de Maand – November 2021

**Hoe moet ik op een nieuwe of stijgende MDi of geleidbaarheid reageren?**

Ondanks alle kennis vinden veehouders het vaak moeilijk te bepalen wat wanneer te doen.

Bij koeien met regelmatig een te hoge MDi of geleidbaarheid is eigenlijk alleen de vraag of u bij deze koe op een eerder moment de juiste beslissing hebt genomen, de juiste keuze heeft gemaakt, interessant.

Maar wat zijn de belangrijke stappen bij nieuwe gevallen? Dan gaat het er eigenlijk om dat u inschat of de koe de door DelPro geregistreerde bacterie aanval zelf af kan slaan of dat uw ondersteuning nodig is.

Dus:

1. Is het een incident, bijvoorbeeld na een tocht, of een gekke gebeurtenis in de stal of robot.
2. Hoe is de conditie van de koe, is ze in goede conditie en fit, geen andere ontstekingen of storende kneuzingen op het lichaam, gebruikt ze alle vier poten goed en gelijk, pens goed gevuld en zit ze niet (te diep) in de negatieve energiebalans?
3. Was het een grote stijging? Met ook daling van productie, op betreffende speen?
4. Heeft ze, misschien wel een paar weken, eerder ook verhoging gehad?
5. Hoe is de hygiëne in de stal, heeft ze de mogelijkheid om zelf een bacterie aanval af te slaan?
6. Is het bedrijfscelgetal hoog of juist erg laag?

Als het een echt nieuw geval is volstaat vaak eerst controle op goed leegmelken bij de volgende melkbeurt met eventueel een paar keer goed insmeren met uiermint. Ook geven veehouders wel

eens een bolus, alles om de koe te helpen met haar eigen weerstand de indringers (bacteriën / virussen) te bestrijden. Heeft betreffende koe toch meer geschiedenis of zegt u naar aanleiding van bovengenoemde punten dat ze extra ondersteuning nodig heeft dan moet het grondiger worden aangepakt. Met gezonde koeien en tijdig ingrijpen kunnen we levensduur verhogen en antibiotica gebruik verminderen.