Tipp des Monats – April 2019

Übertragen von Bakterien durch Fliegen.

Die meisten Erreger der Euterentzündung können in kuhgebundene Bakterien und umweltbedingte Bakterien unterteilt werden.

Umweltbedingte Bakterien, wie der häufigste Streptococcus Uberis, breiten sich häufig durch unreine Liegebetten und Laufgänge aus. Oder alte Schmutzigkeit, zum Beispiel in der Nähe von oder unter Wassertrögen, Kuhbürsten, Gitter. Dieser Schmutz wird auch mit die Klauen in die Liegeboxen zurückgeführt und eine Kuh wird sich wieder darin legen ... Oder nicht saubere Melkmaschine.

Kuhgebundene Bakterien wie Staphylokokken Aureus und Streptokokken Agalaktion verbreitet sich von Kuh zu Kuh oder von Milch zu Kuh. Milchlieger, nasse Liegeboxen und wiederum nicht saubere Melkmaschine, die sowohl außen als auch innen nicht richtig gereinigt werden, können sorgen das Bakterien ausbreiten.

Diese kuhgebundenen Bakterien können aber auch von Fliegen übertragen werden!

Und die sind immer in jeder verschüttete oder durchgesickerten Milch ...

Bekämpfen Sie rechtzeitig die Fliegen im Stall, das ist auch für die Eutergesundheit sehr wichtig!

Und wollen Sie anfangen mit Kühe im Wiese oder Weiden Sie schon?

Lesen Sie nagmaal die Tipps dazu:

<https://www.harrytuinier.nl/de/2018/08/01/tip-van-de-maand-augustus-2018/>

<https://www.harrytuinier.nl/de/2017/05/01/tip-van-de-maand-mei>

-2017/