
Preventief Klauwverzorgen, voor of bij droogstand

Zij aanzicht:


Buitenklauw of
aangetaste klauw



Groei tijdens droogstand

Vóór op juiste lengte knippen
en gewoon bekappen: vóór iets minder en
achter iets meer


Binnenklauw of
gezondste klauw



Vóór op juiste lengte knippen
en achter maximale hoogte creëren
en /of behouden *(als het half kan niet aankomen!)*

Onder aanzicht:

buitenklauw - binnenklauw



Een koe weegt meestal tussen de 600 en 750 kg
Het loopt een stuk prettiger wanneer dat gewicht
regelmatig verdeeld wordt over de vier poten
en dus acht klauwen.

Maximale hoogte behouden / creëren

Indien voldoende voorklauw hoogte: bijknippen / inkorten

Bekappen om te genezen en om druk af te halen

Gewichtsverdeling buitenklauw / binnenklauw:

60 %	40 %	vóór dat de koe bekapt is
40 %	60 %	ná dat de koe bekapt is

Wanneer dit gebeurt voor het droogzetten wordt de zieke klauw ontlast en krijgt 2 à 3 maanden de tijd te herstellen. Bij een rantsoen met weinig krachtvoer (-achtige producten) maar wel met extra prik, kan deze klauw gezonder aangroeien en harder worden. Dit vertaalt zich na afkalven in prettiger => vaker, lopen naar VMS en voerhek, dus meer bezoeken en hogere drogestof opname: en dus voor betere, langere productie èn weerstand.

± 50 %	50 %	2 à 3 maanden na bekappen (=> rond afkalven !!! ☺)

* *Wanneer te weinig hoogteverschil gehaald wordt is een blokje noodzakelijk.*