Voor koeien die nog steeds moeilijk aansluiten hebben we de volgende mogelijkheden:



1. Spelen met Melktoestemming (minder vaak of juist vaker melken).
2. Pakt vaak twee spenen in een beker => minder vaak melken.
3. Controleren of koe niet eigenlijk driespeen is.
4. Controleren of bij driespeen het vierde speen voor „ogen VMS“ wel zichtbaar is of juist een erg afwijkende vorm of stand heeft
5. Staat de voerbak niet te lang of juist te kort?
6. Als Oxytocine langzaam komt maar spenen staan daardoor beter => Dubbel spenen reinigen (oudmelkse koe?)
7. Als Oxytocine snel komt en spenen gaan daardoor tegen elkaar aan drukken => spenen reinigen voor deze koe uitzetten
   (Hebben we liever niet, maar voor deze koe….) (Nieuwmelkse koe?)
8. Als Oxytocine snel komt en er loopt melk over de camera: Extra licht voorbehandelen of helemaal niet voorbehandelen.
9. Als koe erg onrustig staat en vaak aftrapt => Stand kort maken; langzamer voeren (voersnelheid bij individuele koe aanpassen);
   speenreinigen uitzetten(!?); of “Einde voorbehandeling zonder vacuüm“ instellen. Dat vindt een koe met lange spenen ook prettiger.
   Ventilator aan (vliegen / bedompte lucht?)
10. Moet voor deze koe ”Tijdelijke melktoestemming wanneer onvolledig gemolken“ hoger gezet worden, of misschien zelfs uitgezet worden?