
V300 / V310



Bei den Kühen, die immer noch schwer anzusetzen sind haben wir die folgenden Möglichkeiten:

1. Spielen mit Melkberechtigungszeit (Weniger oft oder vielleicht öfter Melken).
2. Kontrollieren ob Kuh nicht eigentlich dreistrich ist.
3. Kontrollieren ob bei Dreistrich die Vierte Zitze "für VMS Augen" existiert, oder nicht, oder sie eine abweichende Form hat.
4. Ist Futterschale / Stand nicht zu eng oder zu weit eingestellt?
5. Wenn Oxytocin zu langsam kommt, stehen die Zitzen oft schlechter => Doppelt Zitzen Reinigen (Alt Melkende Kuh?)
6. Wenn Oxytocin schnell kommt und Zitzen drücken dadurch gegen einander oder gegen Euter => nicht Zitzen Reinigen
   (Haben wir lieber nicht, aber für diese Kuh….) (Neu Melkende Kuh?) Oder Punkt 1.
7. Wenn Oxytocin schnell kommt und dadurch läuft Milch über die Kamera: Zitzenreinigen auf Extra Leicht oder gar nicht.
8. Wenn Kuh viel Trappelt => Stand kürzer machen; langsamer Füttern (Futtergeschwindigkeit pro Kuh), nicht Zitzen reinigen (!?), oder
   "Abnahme des Zitzenreinigers ohne Vakuum" einstellen. Das hat eine Kuh mit langen Zitzen auch lieber.
   Ventilator an (Fliegen / stickige Luft)
9. Muss für diese Kuh "Vorübergehende Melkberechtigung bei unvollständiger Melkung" höher gestellt werden
   oder vielleicht ausgestellt werden? (Weil diese Kuh zu schnell nach letzten Melkung zurück kommt).

(Immer kontrollieren dass die Kott-Platte gut funktioniert!)

