
Preventief Klauwverzorgen.


Beste voor koe is om dit vooraf aan droogstand en na ≈ 100 DIL te plannen.
(na periode van negatieve energiebalans)

Zij aanzicht:

Buitenklauw of
aangetaste klauw



Binnenklauw of
gezondste klauw




Groei / herstel tijdens droogstand

Vóór op juiste lengte knippen
en gewoon bekappen: vóór iets minder en
achter iets meer

Vóór op juiste lengte knippen
en achter maximale hoogte creëren
en /of behouden *(als het half kan niet aankomen!)*

Onder aanzicht:

buitenklauw - binnenklauw



Een koe weegt meestal tussen de 600 en 750 kg
Het loopt een stuk prettiger wanneer dat gewicht
regelmatig verdeeld wordt over de vier poten
en dus acht klauwen.

Maximale hoogte behouden / creëren
zo weinig mogelijk wegsnijden

Indien voldoende voorklauw hoogte: bijknippen / inkorten

Bekappen om te genezen en om druk af te halen

Gewichtsverdeling buitenklauw / binnenklauw:

60 % ⇔ 40 % vóór dat de koe bekapt is

40 % ⇔ 60 % ná dat de koe bekapt is

Wanneer dit gebeurt voor het droogzetten wordt de zieke klauw ontlast en krijgt 2 à 3 maanden de tijd te herstellen. Bij een rantsoen met weinig krachtvoer (-achtige producten) maar wel met extra prik kan deze klauw gezonder aangroeien en harder worden. Dit vertaalt zich na afkalven in prettiger => vaker, lopen naar VMS en voerhek, dus meer bezoeken en hogere drogestof opname: en dus voor betere, langere productie èn weerstand.

± 50 % ⇔ 50 % 2 à 3 maanden na bekappen => rond afkalven, en voor lactatiepiek !!

* *Wanneer te weinig hoogteverschil gehaald wordt is een blokje noodzakelijk.*